



Infanrix *hexa*

**Hexavakcína,
na kterou
se můžete
spolehnout!**

DLOUHODOBÁ OSOBNÍ ZKUŠENOST MAMINEK

**Vakcína vhodná
i pro předčasně
narozené děti**

**Mnohaleté
zkušenosti**

V ČR již od roku
2004

**ZEPTĚJTE SE NA OČKOVÁNÍ
PEDIATRA VAŠEHO DÍTĚTE
JEŠTĚ DNES**

www.hexavakcina.cz

Vakcína Infanrix hexa je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte. **Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz.** Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Více zde



PM-CZ-INH-LBND-230001, schváleno 01/2023
GSK, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,
tel: 222 001 111; e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz



Nemoc	Obvyklé příznaky	Možné následky
Záškrt	Zvýšená teplota až horečka, nechutenství, únava, polykací obtíže, zduření krčních lymfatických uzlin, šedavé povlaky na mandlích. Možné těžké problémy s dýcháním vyvolané otokem dýchací trubice.	Záněty a poškození nervů, které může způsobit až trvalé ochrnutí hlasivek a polykacích svalů, dále je možné postižení hybnosti dolních či horních končetin. Postižení srdce (myokarditida). Dýchací obtíže, které mohou vést i k úmrtí udušením.
Tetanus	Většinou náhlý začátek – křeče a zvýšené napětí žvýkacích svalů, dále stažení mimických svalů, svalů hltanu a ztuhlost šíje a čelistí. Obtíže až nemožnost polykání. Současné horečka, pocení, bolest hlavy.	Bez lékařské pomoci (antibiotika, sérum) může skončit smrtí v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému.
Černý kašel	Nejprve jako běžné nachlazení (teplota, rýma, slzení, kašel). Později až velmi silný, dráždivý kašel, který může být dávivý, může znít jako „kokrhání“, přichází v záchvatech, spíše v noci, horečka.	Dlouhodobá rekonvalescence. Krvácení z nosu. Krvácení do spojivek a očních víček. Zápal plic, zánět středního ucha. U nejmenších dětí může kašel vyvolat zástavu dýchání a smrt.
Žloutenka typu B	Chřipkové příznaky jako únava, bolest kloubů a hlavy, bolest břicha, nevolnost, zvracení. Později i žloutenka kůže, bělma, tmavá moč, bílá stolice.	Možný i závažný průběh s jaterním selháním a úmrtím. Onemocnění u dětí častěji než u dospělých přechází do chronické formy – cirhóza a karcinom jater.
<i>Haemophilus influenzae</i> typu b	Náhle vzniklá horečka, potíže až nemožnost polykání – slinění, obtížné dýchání (jen povrchní), chrapt – slabý hlásek.	Zánět středního ucha, zápal průdušek a plic, zánět mozkových blan, seps. Chronické následky, při těžkých formách hlavně poškození sluchu a mozku.
Dětská obrna	Začátek onemocnění většinou bezpříznakově nebo s chřipkovitými příznaky. Při nejtěžší formě postupně vzniká obrna dolních končetin, svalstva trupu, horních končetin i bránice.	Ochrnutí kosterního svalstva, nejčastěji dolních končetin. Nebo později se objevující zvýšená únavnost, svalová či celková slabost, bolesti kloubů a svalů, křeče. Onemocnění může způsobit až trvalou obrnu nebo dokonce vést k úmrtí.

Včasně očkování hexavakcínou pomáhá chránit proti výskytu onemocnění, jejich případným komplikacím a možným následkům.

Hexavakcína je v ČR součástí plošného očkování a aplikuje se dětem ve 2., 4. a přeočkování v 11.-13. měsíci (nejdříve 6 měsíců po poslední dávce základního očkování).

