

# Meningokok dokáže obrátit život vzhůru nohama

PROMLUVTE SI SE SVÝM PRAKTICKÝM  
LÉKAŘEM JEŠTĚ DNES

NECHTE SE OČKOVAT PROTI MENINGOKOKŮM

  
**BEXSERO**

 **MENVEO**



**Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) není časté, ale závažné onemocnění způsobené bakterií *Neisseria meningitidis* (meningokok). Nemoc postihuje nejčastěji děti kojeneckého, předškolního věku a adolescenty, nicméně meningokokem může onemocnět každý. Přibližně 1 z 10 pacientů navzdory lékařské péči zemře a až u 20 % přeživších pacientů se vyskytují celoživotní následky, jako jsou amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Bakterie se přenášejí kapénkovou cestou – např. kýcháním, kašlem nebo líbáním.**

## Fakta o IMO:

- Celkově existuje 12 skupin meningokoků, očkováním preventabilních je 5 z nich. Jsou to skupiny A, B, C, W a Y. Těchto 5 skupin ale způsobuje naprostou většinu všech invazivních meningokokových onemocnění. V České republice se nejčastěji objevují meningokoky skupin B a C.
- Prvotní příznaky onemocnění jsou často nespecifické a mohou se podobat běžnému nachlazení nebo chřipce. Invazivní meningokokové onemocnění může mít perakutní průběh a k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu během prvních 24–48 hodin po vzniku příznaků.
- Onemocnění se projevuje jako meningitida (zánět mozkových blan) a seps (otrava krve), nebo jejich kombinace.
- Účinnou formou prevence je očkování. Jednou z dostupných vakcín určenou k prevenci meningokoků skupiny B je vakcína Bexsero, v případě prevence meningokoků skupin A, C, W a Y je to například vakcína Menveo.

**Vakcína proti meningokokům B je hrazena, je-li očkování zahájeno do dovršení 12. měsíce věku. Vakcína proti meningokokům A, C, W a Y je hrazena, je-li očkování provedeno ve druhém roce života. Obě vakcíny jsou hrazeny také, je-li očkování zahájeno od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Na očkování mimo úhradové skupiny můžete využít příspěvku zdravotních pojišťoven.**

|  | Věk v době první dávky | Základní očkování | Interval mezi dávkami základního očkování | Posilovací dávka                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2 a více let           | 2 dávky           | ≥1 měsíc                                  | U jedinců, kteří jsou vystaveni setrvalému riziku expozice meningokokovému onemocnění, má být zvaženo podání posilovací dávky dle oficiálních doporučení. |

Orientační cena jedné dávky vakcíny Bexsero je 2 300 Kč.

|  | Věk v době první dávky                 | Základní očkování | Posilovací dávka                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Děti (od 2 let), dospívající a dospělí | 1 dávka           | Potřebu a načasování podání posilovací dávky u jedinců dříve očkovanych vakcínou Menveo je třeba určit podle národních doporučení. |

Orientační cena jedné dávky vakcíny Menveo je 1 500 Kč.

# DŮLEŽITOST OČKOVÁNÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN

**Očkování proti meningokokům je doporučeno pro osoby bez ohledu na věk v následujících zdravotních indikacích:**

- a) porušená či zaniklá funkce sleziny [hyposplenismus/asplenismus]; v případě plánované splenektomie se očkování provede nejméně 14 dní před výkonem,
- b) autologní a alogenní transplantace kmenových hemopoetických buněk,
- c) primární nebo sekundární imunodeficit nebo očekávaný imunodeficit,
- d) deficit terminálního komplementu,
- e) prodělaná bakteriální meningitida nebo sepse,
- f) před zahájením léčby eculizumabem.



**Dále je očkování proti meningokokům doporučeno bez ohledu na věk, následujícím osobám, které jsou ve zvýšeném riziku výskytu IM0:**

- cestující nebo osoby plánující trvalý pobyt v zemích s hyperendemickým nebo epidemickým výskytem IM0,
- osoby v profesionálním riziku IM0 (zdravotnický personál pečující o pacienty s IM0, laboratorní pracovníci pracující s původci IM0),
- osoby v ohnisku nákazy IM0,
- osoby v novém kolektivu s ohledem na individuální posouzení míry rizika.





# MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

**ZEPTĚJTE SE NA OČKOVÁNÍ SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE JEŠTĚ DNES!**



**Nedám šanci meningokokům**  
[www.meningokoky.cz](http://www.meningokoky.cz)

Vakcíny Bexsero a Menveo jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis.

Vakcíny se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže).

O očkování se poraďte se svým lékařem.

**Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na [www.gskkompendium.cz](http://www.gskkompendium.cz).**

Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na [cz.safety@gsk.com](mailto:cz.safety@gsk.com).

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,  
 tel.: 222 001 111, e-mail: [cz.info@gsk.com](mailto:cz.info@gsk.com), [www.gsk.cz](http://www.gsk.cz)

PM-CZ-BEX-LBND-230003  
 Schváleno 12/2023

Více o invazivním  
 meningokokovém  
 onemocnění zde:

