

Meningokok umí změnit život navěky


BEXSERO

vakcína proti meningokokům skupiny B
(rDNA, komponentní, adsorbovaná)

Díky očkování se vaše plány
nemusí rozpadnout

Zptejte se lékaře Vašeho dítěte
na očkování proti meningokoku B
ještě dnes

Více o invazivním
meningokokovém
onemocnění zde:



meningokoky.cz

**OČKOVÁNÍ
HRAZENO**

při zahájení očkování
do 1 roku
a od 14 do 16 let

Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com.

Očkování nemusí chránit 100 % očkovanych.

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c,
140 00 Praha 4, tel.: 222 001 111, e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz

PM-CZ-BEX-LBND-250001
Schváleno 01/2025



NEZAPOMÍNEJTE NA PREVENCI A CHRAŇTE SVÉ DĚTI OČKOVÁNÍM I V DOSPÍVÁNÍ

GSK

**Očkování je efektivní forma ochrany
před infekčními onemocněními.**



9 let

**PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA**

10-11 let

**HRAZENÁ
OČKOVÁNÍ**

Povinné
přeočkování
proti záškrtu,
tetanu,
černému kašli
a dětské obrně

11 let

**PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA**

13 let

**PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA**

11-15 let

**HRAZENÁ
OČKOVÁNÍ**

Doporučené
očkování proti
lidskému
papilomaviru

15 let

**PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA**

14-16 let

**HRAZENÁ
OČKOVÁNÍ**

Doporučené
očkování proti
meningokokům
skupiny B
a A, C, W, Y

17 let

**PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA**

Adolescenty je možné a vhodné chránit očkováním
i proti těmto onemocněním: žloutenka typu A,
klíšťová encefalitida, Covid-19, chřipka, plané neštovice.