


Proč se nechat očkovat?

Bolest způsobená pásovým oparem může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i vaše každodenní běžné činnosti, jako jsou chůze nebo spánek.

Bez ohledu na to, jak zdraví se cítíte, váš imunitní systém s přibývajícím věkem přirozeně slábne, a to vás vystavuje zvýšenému riziku vzniku pásového oparu. Tento s věkem související pokles imunity umožní viru se reaktivovat a způsobit tak pásový opar.

Užívejte si aktivního života naplno a nenechte se zaskočit šokující bolestí. Nedovolte pásovému oparu, aby vás připravil o důležité momenty vašeho života. Myslete na prevenci včas.

Očkovací schéma



Systém 2 dávek

Vakcína SHINGRIX se podává ve 2dávkovém schématu.

Obdržíte 2 samostatné injekce v odstupu 2 měsíců. Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, může být druhá dávka podána mezi 2 a 6 měsíci po první dávce. Pro zajištění maximální možné ochrany je nezbytné, abyste dostali obě dávky.

Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem.

Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz.

Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com.
Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

GSK

GlaxoSmithKline, s.r.o.,

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,

tel.: 222 001 111; e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz

PM-CZ-SGX-LBND-250002

schváleno 01/2025

GSK

JSTE DIABETIK?

**PAK JSTE VE VYŠŠÍM
RIZIKU ROZVOJE
PÁSOVÉHO OPARU.**

Více o očkování
proti pásovému
oparu



www.shingrix.cz

Využijte příspěvek
na očkování proti
pásovému oparu
od své zdravotní
pojišťovny, např.
u VZP **3 000 Kč**
od 50 let věku*

* Možnost čerpání příspěvku na očkování proti pásovému oparu a jeho výši je nutné vždy ověřit u příslušné pojišťovny.

VAKCÍNA **SHINGRIX** POMÁHÁ CHRÁNIT
DOSPĚLÉ JEDINCE PŘED PÁSOVÝM
OPAREM A POSTHERPETICKOU
NEURALGIÍ - DLOUHODOBOU
BOLESTÍ NERVU PO ONEMOCNĚNÍ
PÁSOVÝM OPAREM.

Vakcína SHINGRIX je určena pro:

- dospělě ve věku 50 let a starší
- dospělě ve věku 18 let a starší se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu



SHINGRIX
VAKCÍNA PROTI PÁSOVÉMU OPARU

Co je pásový opar?

Pásový opar, latinsky herpes zoster, je bolestivé onemocnění, které může být doprovázeno závažnými komplikacemi. Nejčastěji se vyskytuje u osob starších 50 let a u osob s oslabeným imunitním systémem.

Onemocnění se projevuje výsevem puchýřů na kůži. Tato bolestivá vyrážka, která může trvat až několik týdnů, se obvykle objevuje na jedné straně těla v oblasti trupu. Může se ale vyskytnout i jinde, například na krku nebo v obličeji.

Nejčastější komplikací pásového oparu je dlouhotrvající bolest nervů, (postherpetická neuralgie PHN), která dokáže otrávit vaším aktivním životem na celé týdny, měsíce nebo dokonce roky.

Kdo a proč je v riziku rozvoje pásového oparu?

V riziku rozvoje pásového oparu je každý, kdo prodělal plané neštovice.

Pásový opar je způsoben reaktivací viru varicella zoster, stejného viru, který způsobuje plané neštovice. Ten po zhojení planých neštovic zůstává ve „spícím“ stavu v těle trvale.

**VÍCE NEŽ 90 % DOSPĚLÝCH VE
VĚKU 50 LET A STARŠÍCH MÁ VIRUS,
KTERÝ ZPŮSOBUJE PÁSOVÝ OPAR,
JIŽ V TĚLE.**

**AŽ U 1 ZE 3 LIDÍ SE MŮŽE TENTO
VIRUS V PRŮBĚHU ŽIVOTA
REAKTIVOVAT A ZPŮSOBIT PÁSOVÝ OPAR***

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

Diabetes může zvýšit riziko rozvoje pásového oparu a s ním spojených komplikací

Až o 38 %

vyšší riziko rozvoje pásového oparu u pacientů s diabetem než u lidí bez diabetu.

Až o 19 %

vyšší riziko rozvoje **postherpetické neuralgie** u pacientů s diabetem, kteří onemocní pásovým oparem než u lidí bez diabetu.

Možné komplikace pásového oparu

Postherpetická neuralgie (PHN)

Postherpetická neuralgie, neboli dlouhodobá bolest nervů, je silná bolest nervových zakončení, jež může v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat měsíce i roky. PHN se může vyskytnout až u 30 % pacientů, kteří prodělají pásový opar. U starších lidí se může vyskytovat častěji a může být závažnější než u mladých lidí.

Herpes zoster ophthalmicus

Herpes zoster ophthalmicus je označení pro případy pásového oparu, kdy dojde k rozvoji puchýřovité vyrážky v oblasti oka. K tomu dochází až v 10-25 % případů pásového oparu. Pokud pásový opar oči postihne může dojít ke komplikacím, které s sebou nesou riziko poškození zraku.

Další možné komplikace[†]

Mezi další možné komplikace patří například problémy se sluchem a poruchy rovnováhy, dojde-li k postižení sluchového nervu.

[†]Nejedná se o úplný výčet možných komplikací, které se mohou objevit v důsledku pásového oparu. Pro další informace se obraťte na svého lékaře.